

Region Örebro län

På gränsen till det uthärdliga vid gränsen för fruktansamheten?

Juliane Baumgart
PhD, Överläkare
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Region Örebro län


Normal menstruation

- cykelns längd: 25-35 dagar (29 dagar)
follikelfasen varierar,
lutealfasen konstant ca 12 dagar
- duration: 3-7 dagar
- total blödningsmängd: 25-80 ml
- normalt Hb
- interindividuell variation max 3 dagar

Region Örebro län

Menstruationsrubbningar - definitioner

➤ Menorrhagi	riktig blödning i rätt tid
➤ Metrorragi	blödning i fel tid
➤ Mono-metrorragi	riktig blödning i fel tid
➤ Oligomenorré	> 35 dagars intervall
➤ Amenorré	utebliven mens > 6 månader





Menorrhagi

HMB (heavy menstrual bleeding)

➤ Definition: Återkommande, riklig menstruation i rätt tid

- > 80 ml blödning, (>7 dagar)
- ofta anemi, sänkt ferritin



- byter skydd nattetid
- koagler
- blöder igenom, använder dubbla skydd
- blödningsschema
- trötthet, yrsel



Menorrhagi


➤ Incidens:

- självuppskattat 30%
- objektivt 11-13%




Menorrhagi - Orsaker

➤ Strukturella orsaker: myom



Menorrhagi - Orsaker


➤ Strukturella orsaker: adenomyos



Region Örebro län

Menorrhagi - Orsaker

- Strukturella orsaker: polyper



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

Region Örebro län

Menorrhagi - Orsaker

- Koagulopatier
 - von Willebrands sjukdom
 - trombocytfunktionsdefekt
- endokrina orsaker
 - hypotyreos
- iatrogen
 - läkemedel
 - kopparspiral
- hyperplasi/ malignitet

ideopatisk

Region Örebro län





Menorrhagi – Utredning i primärvården

- anamnes
- gynstatus
 - spekulumundersökning
 - cytologprov v.b.
 - bimanuell palpation
- provtagning:
 - Hb, (ferritin)
 - vid misstanke: graviditetstest
 - vid misstanke: tyreoidaprover
 - vid misstanke: koagulationsutredning

Region Örebro län

Menorrhagi – Utredning hos gynekolog

- vaginalt ultraljud
- hydrosonografi
- endometriebiopsi
- hysteroskopi



Region Örebro län

Metrorragi – orsaker och behandling

- Endokrina orsaker: anovulatorisk blödning

Region Örebro län

Region Örebro län

Region Örebro län

Metrorragi – orsaker och behandling

- Endokrina orsaker: anovulatorisk blödning

Behandling i tonåren:

- kombinerade metoder
• (gestagen)

vid PCOS:


- kombinerade antiandrogena metoder
• gestagen

i perimenopaus:

- cyklik gestagen: Provera (MPA) 10 mg x 1
Primolut Nor (NETA) 5mg x 2 i 10-12 dagar
• hormonspiral


Metrorragi - Orsaker

- Endokrina orsaker: ovulationsblödning




Metrorragi - Orsaker

- Endokrina orsaker: spottings



Metrorragi - Orsaker

- Endokrina orsaker: atrofiblödning



Metrorragi - Orsaker

- Exogena orsaker:
 - Läkemedel (Waran, Trombyl, NOAK, psykofarmaka)

Region Örebro län

AUB – Abnormal uterine bleeding

Klassifikation enligt FIGO

PALM-COEIN

Polyp	Coagulopathy
Adenomyosis	Ovulatory dysfunction
Leiomyoma	Endometrial
Malignancy & hyperplasia	Iatrogenic
	Not yet classified



Munro MG et al. Int J of Gynaecol Obstet 2011 Apr;113(1):3-13

Region Örebro län


Postmenopausblödning

➤ Definition: blödning > 12 månader efter menopaus

remitteras till gynekolog

Region Örebro län

Tack för uppmärksamheten!



juliane.baumgart@regionorebrolan.se